

Ανταπόκριση στην Υπερβολική Δόση Οπιοειδών

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για τη χορήγηση της ένεσης ναλοξόνης Prenoxad

1

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ελέγξτε την ασφάλεια του ατόμου και του περίγυρου χώρου για τυχόν κινδύνους.



2


ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΔΟΣΗ ΟΠΙΟΕΙΔΩΝ; ΕΛΕΓΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ

- Δεν ανταποκρίνεται
- Μικρές κόρες των ματιών σαν κεφαλή καρφίτσας
- Δεν αναπνέει κανονικά - ρηχή αργή αναπνοή ή ροχαλητό
- Χλωμό ή κρύο δέρμα, μπλε ή γκρίζα χείλη και άκρα δαχτύλων των χεριών



3


ΚΑΛΕΣΤΕ ΤΟ ΤΡΙΠΛΟ ΜΗΔΕΝ (000)



4

ΞΑΠΛΩΣΤΕ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΣΤΟ ΠΛΑΙ


Τοποθετήστε το άτομο σε θέση ανάνηψης.



συνεχίζεται στην επόμενη σελίδα

5

ΒΙΔΩΣΤΕ ΤΗ ΒΕΛΟΝΑ ΠΑΝΩ ΣΤΗΝ ΠΡΟΓΕΜΙΣΜΕΝΗ ΣΥΡΙΓΓΑ PRENOXAD



6

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΗ ΒΕΛΟΝΑ


Εισαγάγετε τη βελόνα στην
έξω πλευρά του μηρού ή
στον άνω βραχίονα.



7

ΧΟΡΗΓΗΣΤΕ ΜΙΑ ΔΟΣΗ ΝΑΛΟΞΟΝΗΣ


Χορηγήστε 0,4 mL, μέχρι την
1η μαύρη γραμμή στη σύριγγα
(η σύριγγα Prenoxad περιέχει
5 δόσεις).



8

ΑΝΑΠΝΕΕΙ;


Εάν όχι,
χρησιμοποιήστε
αναπνοές διάσωσης εάν
ξέρετε πώς - ξαπλώστε
το άτομο ανάσκελα και
δώστε 2 αναπνοές.



9

ΑΝΑΝΗΨΗ


Τοποθετήστε το άτομο
σε θέση ανάνηψης.
Μείνετε μαζί του
μέχρι να φτάσει το
ασθενοφόρο.



10

ΕΠΑΝΑΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ

Εάν δεν υπάρχει
ανταπόκριση, χορηγήστε
άλλη μια δόση των 0,4 mL
(έως την επόμενη μαύρη
γραμμή) κάθε 2 έως 3 λεπτά
μέχρι να ανακάμψει το άτομο
ή να φτάσει το ασθενοφόρο.



**Χρησιμοποιήστε τη ναλοξόνη για να αντιστρέψετε την υπερβολική δόση οπιοειδών
(π.χ. ηρωίνη, μορφίνη, μεθαδόνη, οξυκωδόνη, συνταγογραφούμενα οπιοειδή, φαιντανύλη).
Χρειάζονται 2-5 λεπτά για να αρχίσει να δρα και διαρκεί περίπου 30-90 λεπτά.**

Για να λάβετε αυτό το έγγραφο σε άλλη μορφή, στείλτε email στη διεύθυνση <aod.enquiries@health.vic.gov.au>.

Αναπαράγεται με άδεια, NSW Health © 2023.

Εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε από την Κυβέρνηση της Βικτώριας, 1 Treasury Place, Μελβούρνη. © Πολιτεία της Βικτώριας, Αυστραλία, Υπουργείο Υγείας, ISBN 978-1-76131-460-5 (PDF/online/MS word).

Διαθέσιμο από [τον ιστότοπο του υπουργείου](https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program) <<https://www.health.vic.gov.au/aod-treatment-services/victorias-take-home-naloxone-program>>. Νοέμβριος 2023. (2303380).